

**Bilaga 5 Praxisundersökning****Bakgrund**

Suicid är ett folkhälsoproblem i Sverige, mellan 1 100-1 200 människor dör varje år. Den diagnostiska bedömningen baserar sig vanligtvis på ett eller flera samtal med patienten, men för att försöka förbättra den kliniska intervjun har ett antal olika instrument för att bedöma suicidrisk utvecklats.

Syftet med SBU:s utvärdering är att undersöka om dessa instrument är tillförlitliga. Projektet omfattar en systematisk litteraturgranskning som kompletteras med en praxisundersökning samt en etisk analys. Rapporten beräknas vara klar under 2015. Med denna praxisundersökning vill vi undersöka i vilken utsträckning instrument används vid suicidriskbedömningar av läkare i specialistpsykiatrivården.

Praxisundersökning – Instrument för suicidriskbedömning		Ofta	Sällan	Aldrig
1.	Använder du bedömningsinstrument som tillägg till den kliniska bedömningen vid suicidriskbedömning? Om nej, gå till fråga tre.			
2.	Har du använt något av följande instrument?		Ja	Nej
	BDI (Beck Depression Inventory)			
	BHS (Becks Hopelessness Scale)			
	MADRS-S (Montgomery Åsberg Depression Rating Scale)			
	MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview)			
	MINI-KID (Mini International Neuropsychiatric Interview for Children and Adolescents)			
	PHQ-9 (Patient Health Questionnaire for Depression)			
	Sad Persons Scale			
	SIS (Suicide Intent Scale)			
	Annat:			
3.	Till sist lite om dig själv: i vilket landsting är du verksam och vilken typ av tjänstgöring har du?			
	Landsting	AT-läkare	ST-läkare	Specialist