



Bilaga 5. Metaanalyser


MI/MET och PNF




Figur 2 Antal dagar med spelande de senaste 30 dagarna, posttest efter behandling med MI/MET/PNF




Figur 3 Antal dagar med spelande de senaste 30 dagarna efter behandling med MI/MET/PNF, uppföljning efter 9–12 månader




Figur 4 totala insatser på spel de senaste 30 dagarna, posttest efter behandling med MI/MET/PNF



Figur 5 Total spelinsats på spel de senaste 30 dagarna efter MI/MET/PNF, uppföljning efter 9–12 månader




Figur 6 Skattning av svårighetsgrad av spelrelaterade problem posttest efter behandling med MI/MET/PNF




Figur 7 Skattning av svårighetsgrad av spelrelaterade problem vid uppföljning 9–12 månader efter behandling med MI/MET/PNF

KBT




Figur 8 effekter av KBT på skattad svårighetsgrad av spelproblem jämfört med kontroll posttest

KBT i kombination med MI/MET/PNF eller mindfulness



Figur 9 Skattning av svårighetsgrad spelproblem efter kombinationsbehandling med KBT, posttest.



Figur 10 Skattning av svårighetsgrad spelproblem efter kombinationsbehandling med KBT, uppföljning efter nio månader



Figur 11 Skattning av tvångsmässigt spelande efter behandling med naltrexon jämfört med placebo.